PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS **CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO NOS MOLDES *FELLOW* DA ÁREA DE ENSINO MÉDICO** ANO LETIVO 2027.

EDITAL Nº 001/2026

CHAVE DE CORREÇÃO

103 - DERMATOLOGIA EM ONCOLOGIA

BANCA ORGANIZADORA

INTEC INSTITUTO DE PESQUISA, GESTÃO E TECNOLOGIA
processoseletivo@institutointec.org.br
(31) 3016-3027

QUESTÃO Nº 1 - 20,00 PONTOS

Em relação ao lentigo maligno, sabe-se que o tratamento cirúrgico é considerado o padrão ouro. Na impossibilidade de realização do procedimento cirúrgico, quais são as opções terapêuticas disponíveis?

CHAVE DE CORREÇÃO:

Nos casos em que a cirurgia não é possível, radioterapia e imiquimode podem ser utilizados.

Justificativa da resposta questão 1: O tratamento cirúrgico, preferencialmente com controle de margens, permanece como tratamento de escolha. Entretanto, nos casos em que a cirurgia não pode ser realizada por condições clínicas, localização da lesão ou impossibilidade de obtenção de margens cirúrgicas adequadas, modalidades não cirúrgicas como imiquimode ou radioterapia, podem ser utilizadas.

QUESTÃO Nº 2 - 20,00 PONTOS

Descreva as principais características dermatoscópicas do melanoma subungueal.

CHAVE DE CORREÇÃO:

Multiplicidade de cores, quebra do paralelismo das linhas, alargamento da faixa da melanoniquia, aspecto irregular.

Justificativa da resposta questão 2: O melanoma subungueal se caracteriza dermatoscopicamente pele presença de alterações que refletem a proliferação desorganizada da matriz ungueal. A irregularidade da faixa e a perda do paralelismo das linhas longitudinais são achados sugestivos de malignidade. A combinação desses sinais, especialmente quando associada à progressão da lesão, aumenta a suspeita de melanoma.

QUESTÃO Nº 3 - 20,00 PONTOS

Descreva as principais características clínicas e epidemiológicas do carcinoma de células de Merkel.

CHAVE DE CORREÇÃO:

Afeta principalmente idosos. Exposição solar e imunossupressão são fatores de risco. Geralmente, se apresenta como nódulo eritematoso ou violáceo, firme, solitário e de crescimento rápido. Pode ulcerar. Acometimento linfonodal ou à distância pode estar presente no momento do diagnóstico.

Justificativa da resposta questão 3: O carcinoma de células de Merkel é uma neoplasia agressiva, vista principalmente em idosos, com associação à exposição solar e imunossupressão. Sua apresentação típica é um nódulo firme, solitário e de crescimento rápido. Possui elevada capacidade de disseminação linfática e hematogênica, o que explica a possibilidade de comprometimento regional ou à distância já no diagnóstico e reforça a importância do reconhecimento precoce.

QUESTÃO Nº 4 - 20,00 PONTOS

Explique por que a pele, os folículos pilosos e a matriz ungueal são alvos frequentes dos efeitos adversos da quimioterapia citotóxica convencional.

CHAVE DE CORREÇÃO:

Porque pele, folículos pilosos e matriz ungueal apresentam células com elevada atividade proliferativa. Como a quimioterapia citotóxica atua preferencialmente sobre células em divisão, esses tecidos são frequentemente afetados.

Justificativa da resposta questão 4: Os agentes quimioterápicos citotóxicos convencionais interferem em diferentes etapas do ciclo celular e, consequentemente, afetam principalmente células com alta de proliferação celular, como a epiderme, a matriz do folículo piloso e a matriz ungueal. Por isso, esses tecidos são particularmente vulneráveis, resultando em manifestações clínicas como alterações cutâneas, alopecia e alterações ungueais.

QUESTÃO Nº 5 - 20,00 PONTOS

A síndrome mão-pé é um dos principais eventos adversos cutâneos associados à quimioterapia. Descreva as principais manifestações clínicas dessa síndrome.

CHAVE DE CORREÇÃO:

Eritema, hiperpigmentação, edema, bolha, descamação, fissuras e dor nas palmas e plantas.

Justificativa da resposta questão 5: A síndrome mão-pé resulta da toxicidade de determinados agentes quimioterápicos sobre a pele das regiões palmoplantares. Clinicamente, se manifesta por eritema, edema, alterações da sensibilidade e dor, podendo evoluir para hiperpigmentação, descamação, formação de bolhas e fissuras. Nos casos mais intensos, as alterações podem comprometer as atividades diárias do paciente.